

2017 年度 東京大学（前期）**医学部**

試験時間：150 分

 全問必答**1** 実数 a, b に対して

$$f(\theta) = \cos 3\theta + a \cos 2\theta + b \cos \theta$$

とし、 $0 < \theta < \pi$ で定義された関数

$$g(\theta) = \frac{f(\theta) - f(0)}{\cos \theta - 1}$$

を考える。

- (1) $f(\theta)$ と $g(\theta)$ を $x = \cos \theta$ の整式で表せ。
- (2) $g(\theta)$ が $0 < \theta < \pi$ の範囲で最小値 0 をとるための a, b についての条件を求めよ。また、条件をみたす点 (a, b) が描く図形を座標平面上に図示せよ。

2 座標平面上で x 座標と y 座標がいずれも整数である点を格子点という。格子点上を次の規則に従って動く点 P を考える。

- (a) 最初に、点 P は原点 O にある。
 - (b) ある時刻で点 P が格子点 (m, n) にあるとき、その 1 秒後の点 P の位置は、隣接する格子点 $(m+1, n)$, $(m, n+1)$, $(m-1, n)$, $(m, n-1)$ のいずれかであり、また、これらの点に移動する確率は、それぞれ $\frac{1}{4}$ である。
- (1) 点 P が、最初から 6 秒後に直線 $y = x$ 上にある確率を求めよ。
 - (2) 点 P が、最初から 6 秒後に原点 O にある確率を求めよ。

3 複素数平面上的の原点以外の点 z に対して、 $w = \frac{1}{z}$ とする。

- (1) α を 0 でない複素数とし、点 α と原点 O を結ぶ線分の垂直二等分線を L とする。点 z が直線 L 上を動くとき、点 w の軌跡は円から 1 点を除いたものになる。この円の中心と半径を求めよ。
- (2) 1 の 3 乗根のうち、虚部が正であるものを β とする。点 β と点 β^2 を結ぶ線分上を点 z が動くときの点 w の軌跡を求め、複素数平面上に図示せよ。

4 $p = 2 + \sqrt{5}$ とおき、自然数 $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して

$$a_n = p^n + \left(-\frac{1}{p}\right)^n$$

と定める。以下の問いに答えよ。ただし設問(1)は結論のみを書けばよい。

- (1) a_1, a_2 の値を求めよ。
- (2) $n \geq 2$ とする。積 $a_1 a_n$ を、 a_{n+1} と a_{n-1} を用いて表せ。
- (3) a_n は自然数であることを示せ。
- (4) a_{n+1} と a_n の最大公約数を求めよ。

5 k を実数とし、座標平面上で次の2つの放物線 C, D の共通接線について考える。

$$C: y = x^2 + k$$

$$D: x = y^2 + k$$

- (1) 直線 $y = ax + b$ が共通接線であるとき、 a を用いて k と b を表せ。ただし $a \neq -1$ とする。
- (2) 傾きが2の共通接線が存在するように k の値を定める。このとき、共通接線が3本存在することを示し、それらの傾きと y 切片を求めよ。

6 点 O を原点とする座標空間内で、一辺の長さが1の正三角形 OPQ を動かす。また、点 $A(1, 0, 0)$ に対して、 $\angle AOP$ を θ とおく。ただし $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ とする。

- (1) 点 Q が $(0, 0, 1)$ にあるとき、点 P の x 座標がとりうる値の範囲と、 θ がとりうる値の範囲を求めよ。
- (2) 点 Q が平面 $x = 0$ 上を動くとき、辺 OP が通過する範囲を K とする。 K の体積を求めよ。

2017 年度 東京大学（前期）**医学部**

（略解）

 証明，図示などは省略**1**

(1) $f(\theta) = 4x^3 + 2ax^2 + (b-3)x - a$, $g(\theta) = 4x^2 + (2a+4)x + 2a+b+1$

(2) $-6 < a < 2$ かつ $b = \frac{a^2 - 4a}{4}$, 図示は省略

2

(1) $\frac{5}{16}$

(2) $\frac{25}{256}$

3

(1) 中心: $\frac{1}{\alpha}$, 半径: $\frac{1}{|\alpha|}$

(2) $|w+1| = 1$ かつ $|w| \geq 1$, 図示は省略

4

(1) $a_1 = 4$, $a_2 = 18$

(2) $a_1 a_n = a_{n+1} - a_{n-1}$

(3) 証明は省略

(4) 2

5

(1) $k = \frac{a^2 - a + 1}{4a}$, $b = \frac{(1+a^2)(1-a)}{4a}$

(2) 証明は省略, (傾き, y 切片) = $(-1, \frac{1}{8})$, $(\frac{1}{2}, \frac{5}{16})$, $(2, -\frac{5}{8})$

6

(1) $-\frac{\sqrt{3}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$, $30^\circ \leq \theta \leq 150^\circ$

(2) $\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$