2018年度 長崎大学 (前期)**医学部**

試験時間：120 分

全問必答**1** 以下はそれぞれ個別の問題である。各問いに答えよ。(1) 数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和を S_n とする。

$$S_n = 6n - 2a_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

が成り立つとき、初項 a_1 および一般項 a_n を求めよ。(2) $\sin \frac{\alpha - \beta}{2} = A$ とするとき、

$$(\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2$$

の値を A を用いて表せ。

(3) 方程式

$$\log_2 x^2 = 2 + \log_2 |x - 2|$$

を解け。

(4) 関数 $f(x)$ を

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x & (x < 0) \\ x & (x \geq 0) \end{cases}$$

と定義する。「微分係数の定義」にしたがって、 $f(x)$ の $x = 0$ における微分係数を求めよ。

2 半径 a の円が x 軸上を滑ることなく正の方向に回転していくとき、円周上の 2 つの定点 P と Q の運動について考える。時刻 $t = 0$ のとき P は原点 O にあり、 Q は点 $(0, 2a)$ にある。円は毎秒 1 ラジアンで回転する。このとき、点 P の時刻 t における座標 (x, y) は

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

で表される。以下の問いに答えよ。

- (1) 時刻 t における円の中心 C と点 Q の座標を、それぞれ求めよ。
- (2) 時刻 t における点 P の速度ベクトル $\vec{v}_P = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right)$ を求めよ。また、時刻 t が $0 \leq t \leq 2\pi$ の範囲において、速さ $|\vec{v}_P|$ の最大値と最小値、およびその時の P の座標を求めよ。
- (3) 時刻 t における点 Q の速度ベクトル $\vec{v}_Q$ を求めよ。さらに、内積 $\vec{v}_P \cdot \vec{v}_Q$ を求めよ。
- (4) 時刻 $t = \frac{\pi}{2}$ から $t = \frac{3\pi}{2}$ までの間に点 P が動く道のり L_P と、点 Q が動く道のり L_Q を、それぞれ求めよ。

3 t を正の実数とし、複素数平面上に 2 点 $A(t), B\left(-\frac{1}{t}\right)$ がある。等式

$$t \left| z + \frac{1}{t} \right| = \frac{1}{t} |z - t| \tag{a}$$

を満たす点 $P(z)$ の全体が表す図形を F とする。下の小問 (1) から (4) を通して F がどのような図形を表すか調べたい。以下の問いに答えよ。

- (1) A と B はどちらも図形 F の点ではないことを示せ。
- (2) $t = 1$ ならば、 F はどのような図形を表すか。
- (3) $t \neq 1$ とする。図形 F の点 $P(z)$ が直線 AB 上に位置するような z の値は 2 つある。その値 z_1 と z_2 を求めよ。ただし、 $|z_1| < |z_2|$ とする。
- (4) $t \neq 1$ とする。2 点 $P_1(z_1), P_2(z_2)$ を結ぶ線分の中点を $M(m)$ として、 m の値を求めよ。また、 $P(z)$ が図形 F の点であるとき、 $|z - m|$ の値を求めよ。さらに、 F はどのような図形を表すか。

4 積分を用いて表される次の関数

$$F_n(x) = \int_0^x \frac{t^n}{n!} e^{-t} dt \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

について、以下の問いに答えよ。ただし、 $0! = 1$ と定める。また、関数 $y = t^0$ は、関数 $y = 1$ を意味する。

- (1) 部分積分を利用して、 $F_2(x)$ を $F_1(x)$ を用いて表せ。同様に、 $F_1(x)$ を $F_0(x)$ を用いて表せ。
- (2) $F_0(x)$ を計算し、積分を含まない式として表せ。その結果を利用して、 $F_1(x)$ を積分を含まない式として表せ。さらに、 $F_2(x)$ を積分を含まない式として表せ。
- (3) $n \geq 1$ のとき、 $F_n(x)$ を $F_{n-1}(x)$ を用いて表せ。さらに、 $n \geq 0$ のとき、 $F_n(x)$ を積分を含まない式として表せ。
- (4) $p(x) = x^n$ とおくとき、 k 次導関数

$$p^{(k)}(x) \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

を求めよ。そして、

$$\int_0^x t^n e^{-t} dt = n! - e^{-x} \sum_{k=0}^n p^{(k)}(x)$$

が成り立つことを示せ。ただし、 $p^{(0)}(x) = p(x)$ と定める。

2018年度 長崎大学 (前期)

医学部

(略解)

☞ 証明, 図示などは省略

1

(1) $a_1 = 2, a_n = 6 - 4\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$

(2) $4A^2$

(3) $x = -2 \pm 2\sqrt{3}$

(4) 1

2

(1) $C(at, a), Q(a(t + \sin t), a(1 + \cos t))$

(2) $\vec{v}_P = (a(1 - \cos t), a \sin t)$

最大値: $2a P(\pi a, 2a)$, 最小値: $0 P(0, 0)$ または $(2\pi a, 0)$

(3) $\vec{v}_Q = (a(1 + \cos t), -a \sin t), \vec{v}_P \cdot \vec{v}_Q = 0$

(4) $L_P = 4\sqrt{2}a, L_Q = 4(2 - \sqrt{2})a$

3

(1) 証明は省略

(2) 線分 AB の垂直二等分線

(3) $z_1 = 0, z_2 = \frac{2t}{1-t^2}$

(4) $m = \frac{t}{1-t^2}, |z - m| = \left| \frac{t}{1-t^2} \right|, F$ は点 M を中心とした半径 $\frac{t}{|1-t^2|}$ の円

4

(1) $F_2(x) = -\frac{x^2}{2}e^{-x} + F_1(x), F_1(x) = -xe^{-x} + F_0(x)$

(2) $F_0(x) = 1 - e^{-x}, F_1(x) = 1 - (x+1)e^{-x}, F_2(x) = 1 - \left(\frac{x^2}{2} + x + 1\right)e^{-x}$

(3) $F_n(x) = -\frac{x^n}{n!}e^{-x} + F_{n-1}(x) (n \geq 1), F_n(x) = 1 - e^{-x} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} (n \geq 0)$

(4) $p^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!}x^{n-k}$, 証明は省略